



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Hygrophoraceae*

Hygrophorus penarius Fr.

Synonyme : *H. barbatulus*

Nom français : Hygrophore comestible

Sous hêtres. Chapeau blanc, plus ou moins ochracé par le centre à maturité. Lames décurrentes et espacées à reflets ochracé rosâtre. Stipe blanc. Spores 6-9 x 4-5,5 µm. A comparer avec :

- *H. penarioides* : véritable sosie lié au chêne (mais signalé également sous noisetier), lames blanc crème, de subtiles différences dans les dimensions sporales sont parfois mentionnées dans la littérature, mais paraissant pour le moment peu convaincantes ;
- *H. poetarum* : sous hêtres, chapeau rosé à crème saumon, odeur nette d'amande amère ;

A noter également l'existence de *H. fagi*, lié également au hêtre, taxon qui se distinguerait selon certains par des teintes plus roses, une synonymie ne serait pas surprenante à notre avis, mais seul un séquençage de nombreuses récoltes pourrait apporter une solution.

Cet hygrophore n'est pas fréquent, nous le rencontrons occasionnellement l'automne dans plusieurs secteurs où existe son écologie de prédilection.

Biblio : littérature courante - Pilzkompendium E. Ludwig Band. 3 - Funga nordica - GEPR.



