



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

## *Xerocomus badiorufus* (Heim)Bon

En forêt, sur sol siliceux. Chapeau sec et velouté, bai à bai pourpré, marge fortement enroulée bordée d'un fin liseré blanc. Tubes typiquement très courts et décurrents ; pores fins, non bleuissants (ou à peine) au toucher. Stipe plus ou moins réticulé au sommet, fusiforme, renflé ou cylindracé. Chair immuable. Spores 10-12 x 3,5-5  $\mu$ m.

A noter l'existence de *X. badius* f. *subimmutabilis* Estadès & Lannoy ad int. (bull. FMDS 174, 2004), qui diffère de *X. badius* par les tubes généralement courts, longtemps blancs à blanchâtres, immuables, les pores petits non bleuissants mais grisonnant plutôt au toucher, la chair immuable ou légèrement rosissante.

De l'avis de nombreux mycologues, *X. badiorufus* est un taxon douteux, nous souhaitons surtout ici présenter des récoltes réalisées dans notre région et que nous estimons pouvoir rapprocher de cette espèce et ouvrir le débat ... dans l'attente d'en savoir éventuellement un jour un peu plus.

- Photographie de gauche : novembre 2012 à Montendre, en milieu sablonneux avec majorité pins.
- Photographie de droite : novembre 2012 aux Essouverts à Lozay, sur sol calcaire, avec majorité conifères (*Abies* et *Douglas*) et chênes.

Biblio : DM HS n° 6 - *Xerocomus* H. Ladurner & G. Simonini (indiqué comme taxon douteux).

*Fiche réalisée en avril 2016 par Patrice TANCHAUD*