



Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Bankeraceae*

Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst.

Synonyme : *S. amarescens*

Sous feuillus. Chapeau irrégulièrement arrondi avec des squames dressées. Aiguillons gris rose pâle, brun-gris avec l'âge. Stipe subconcolore au cheapeau. Chair vert grisâtre à la base. Odeur farineuse, saveur amère. Chair réagissant en bleu-vert au KOH. Spores (5)6-7,3 x 4-5(5,5) µm. Boucles absentes.

Egalement **sous feuillus** avec une réaction verte au KOH, à comparer par exemple avec :

- *S. lepidus* : taxon bien ingrat à séparer à nos yeux, semble se distinguer uniquement par son chapeau peu écailleux et des spores légèrement inférieures ;
- *S. quercinofibulatus* : chair **non verte** à la base du stipe et **présence de boucles**.

De nombreux *Sarcodon* ressemblants poussent **sous conifères**, voir page 2. Des travaux récents ont transféré cette espèce dans le genre *Hydnellum*, de surcroît, *H. scabrosum* serait lié aux conifères, et *H. fagiscabrosum* serait donc le binôme à adopter ici, mais attendons d'avoir le recul nécessaire.

Espèce peu fréquente, et comme toutes celles du genre, poussant dans les vieilles forêts à valeur patrimoniale riche. Nous la rencontrons de l'été (parfois dès juillet) au début d'hiver (décembre), aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres.

Biblio : P. Roux Mille et un champignons p 1131 - BK2 279 - Walter Jülich Guida alla determinazione dei funghi, Vol. 2°.

De nombreux *Sarcodon* poussent sous conifères, par exemple :

- **avec boucles**, chair stipe bleu-vert et KOH bleu-vert : *S. atroviridis* (chapeau gris olive) ;
- **avec boucles**, chair stipe bleu-vert-gris et KOH nul : *S. versipellis* (chapeau jaune orangé ocre) ;
- **avec boucles**, chair stipe non verte et KOH nul : *S. imbricatus* (sous épicéas), *S. leucopus* (bas stipe blanc violeté), *S. squamosus* ;
- **sans boucles**, chair stipe bleu-vert et KOH bleu-vert : *S. amygdaliolens* (odeur d'amande amère), *S. glaucopus* ;
- **sans boucles**, chair stipe bleu vert et KOH nul : *S. fennicus*, *S. regalis* (bas stipe violet) ;
- **sans boucles**, chair stipe non verte et KOH bleu-vert : *S. martioflavus* (bas stipe orange) ;
- **sans boucles**, chair stipe non verte et KOH nul : *S. lundellii*.





