



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula graveolens Romell

Nom français : Russule malodorante

Sous feuillus. Chapeau brun, pourpre, parfois noirâtre ou marbré de roux, jaune verdâtre, brun olivacé. Lames crème puis ochracées. Stipe blanc, brunissant. Saveur douce, odeur de crustacés en train de cuire. Réaction verte au sulfate de fer, typique de la Section *Viridantinae* (ou *Xerampelinae*). Sporée 3a-3b. Spores 8-10 x 6-8 µm avec quelques connexifs.

De nombreuses espèces proches sont ingrates à distinguer et parfois controversées, à comparer par exemple avec :

- *R. faginea* : majoritairement lié au hêtre, mais pousse occasionnellement sous chênes et charmes, allure robuste (chapeau 6-14 cm), sporée 3c-4a, grosses spores à verrues isolées, cuticule constituée de poils ampullacés ;
- *R. purpurata* : parfois distingué (ce que nous faisons) par son chapeau aux couleurs pourpre noirâtre à rouge violacé.

Sous le binôme décrit ici, nous plaçons peut-être des russules qui mériteraient un autre nom d'espèce, par exemple *R. elaeodes* et *R. cicatricata* (binômes placés en synonymie par Sarnari). Rencontrer de telles russules, l'été et l'automne, n'est pas rare dans la région.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.





