



Ordre : *Cantharellales*

Famille : *Cantharellaceae*

Cantharellus pallens Pilát

Synonyme : *Cantharellus subpruinus*

Nom français : Chanterelle pruineuse

En forêt. Chapeau fortement pruineux de blanchâtre, puis jaune. Plis fourchus (comme chez *C. cibarius*, la « vraie » girolle, l'hyménium n'est pas constitué de lames, mais de plis fortement décourants, anastomosés ou ramifiés). Stipe concolore au chapeau. L'ensemble jaunit et roussit assez fortement à la manipulation. Odeur faible mais agréable. Spores 7,5-9 x 4-5 µm.

A comparer notamment avec :

- *C. cibarius* : chapeau entièrement jaune orangé non pruineux, non ou moins roussissant à la manipulation ;
- *C. ferruginascens* : chapeau aux teintes glauques et à chair flasque.

Il s'agit là de l'espèce la plus fréquente de ce genre dans notre région (comme dans beaucoup d'autres), elle est visible tous les ans sur certaines stations entre les mois de mai et d'octobre, exceptionnellement plus tard en saison.

Biblio : littérature courante - clé des chanterelles par G. Eyssartier - GEPR.

Fiche réalisée en août 2024 par Patrice TANCHAUD



