



Ordre : Schizophyllales

Famille : Schizophyllaceae

## ***Schizophyllum amplum*** (Lév.) Nakasone

Synonymes : *Auriculariopsis ampla*, *Cytidia flocculenta*

Champignon lignicole sur brindilles, surtout de peuplier tremble (*Populus tremula*). Chapeau ou « coupe » de consistance coriace ; face supérieure blanchâtre crème ; face inférieure ocre brunâtre, veinée à plissée. Spores 8-10 x 2,5-3 µm.

Cette espèce n'est pas sans rappeler *Auricularia auricula-judae* (Oreille de judas) qui se distingue malgré tout aisément.

Espèce plus ou moins rare selon nos terrains de prospection, nous l'avons récoltée sur les îles de Ré et d'Oléron et à Talmont. Nous citons, avec son autorisation, les propos de notre collègue Jacques Guinberteau au sujet de son écologie : « champignon fixé sur brindilles, à même le sable, en arrière-dune déstabilisée et artificiellement fixée par des branchages et houppiers de résineux et feuillus (tout venant) ; pratique largement répandue par les gestionnaires du littoral afin de limiter l'érosion et les phénomènes de déflation ».

Espèce également régulièrement rencontrée dans le marais poitevin, à la face infère de bois coupés de peuplier, dicit notre collègue Michel Hairaud, et occasionnellement à l'intérieur des terres par notre ami Jean Robert.

Biblio : Guide Vigot p. 676 ; Walter Jülich. Guida alla determinazione dei funghi, vol. 2°, page 159 ; Mille et un champignons P. Roux.

*Fiche réalisée en juin 2017 par Patrice TANCHAUD*





**Photographie Jean Robert**

