



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Hymenogasteraceae*

Alnicola bohemica (Vel.) Kühner & Maire

Nom français : Alnicole de Bohème

Sous feuillus divers, bouleau, saule, chêne, noisetier, etc. Chapeau nettement fibrilleux sur les jeunes exemplaires, châtain, puis ochracé en séchant. Lames beiges. Stipe argenté, voilé et zébré. Odeur de rave à chocolatée, saveur plus ou moins amère. Cheilocystides cylindracées, élargies à la base, en forme de quille. Basides bisporiques. Spores 11-13 x 7,5-8,5 µm, verruqueuses, amygdaliformes à citriformes, dextrinoïdes. A comparer notamment avec :

- *A. macrospora* : sans voile, revêtement piléique différent, spores moins citriformes ;
- *A. rubriceps* (égal *A. glandiformis*) : spores moins larges non dextrinoïdes et cheilocystides plus larges.

Espèce probablement peu fréquente, mais pouvant également être confondue sans un examen rigoureux. La récolte présentée ici a été réalisée en juin 2011 au Galon d'Or à Ronce les Bains, dans un lieu marécageux en présence de chênes, noisetiers et aulnes. Les spores mesuraient 14,5-16,5 x 7,5-9 µm, les basides observées étaient toutes bisporiques et les boucles étaient totalement absentes. Nous remercions M. Pierre-Arthur Moreau pour son aide apportée à l'identification de cette récolte et pour les explications qu'il a bien voulu nous communiquer.

Biblio : littérature courante - Clé du genre *Alnicola* P.-A. Moreau - BK5 129 - GEPR p. 844.