



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Hymenogasteraceae*

Hebeloma crustuliniforme (Bull. : Fr.) Quélet

Nom français : Hébélome croûte de pain

En forêt de feuillus ou conifères. Silhouette robuste. Chapeau ochracé pâle, marge blanchâtre. Lames blanchâtres puis beiges, arête exsudant des gouttelettes limpides, puis brunes. Stipe blanc, floconneux. Odeur de rave, saveur raphanoïde et légèrement amère. Spores 9,5-13 x 5-7 μm , finement verruqueuses, non dextrinoïdes. Cheilocystides clavées pouvant atteindre 95 μm .

Avec une écologie semblable, donc assez variable, à comparer avec quelques espèces généralement moins robustes :

- *H. velutipes* : spores nettement dextrinoïdes ;
- *H. fragilipes* : spores nettement verruqueuses et assez nettement dextrinoïdes ;
- *H. hiemale* : spores nettement verruqueuses et non ou peu dextrinoïdes.

A noter que des études récentes montrent que nous sommes là dans un complexe d'espèces restant encore à débrouiller. Pris au sens large, ces hébélomes sont fréquents sur nos secteurs de prospection, notamment dans les forêts de feuillus, nous les observons en assez grand nombre chaque automne.

Biblio : littérature courante - The Genus Hebeloma Jan Vesterholt - Fungi Europaei 14 Beker, Eberhardt & Vesterholt (2016) - GEPR.

Fiche réalisée en avril 2018 par Patrice TANCHAUD