



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Amanita dryophila Consiglio & Contu

Sous chêne (*Quercus sp.*). Chapeau de couleurs ternes, saturé noisette brun, parfois avec des teintes orange, non ou largement et basement mamelonné. Stipe orné de teintes orangées. Réaction banale au phénol. Spores plus ou moins largement elliptiques, 10-14 x 9-11,5 µm.

Cette amanite de la sous-section *Vaginatinae* (amanites sans anneau) semble visible assez régulièrement dans son écologie (sous chênes) lorsque les conditions sont favorables.

Biblio : Galli : Le Amanite

Avec corrections de M. S. Poumarat :

- page 103 (*sub nomen A. beckeri*) : *A. dryophila*. *A. beckeri* possède un voile général brun (de brun noisette à brun-gris), des cannelures piléiques plus longues et a une stature moins puissante (avec un stipe qui pourrit vite, voir la photo page 104 en bas) que *A. dryophila* qui, elle est bien représentée page 104 haut et page 105 haut.
- page 104 haut (*sub nomen A. beckeri*) : *A. dryophila* . Voir commentaire juste au-dessus.
- page 105 bas (*sub nomen A. oblongispora*) : *A. dryophila* ?