



Ronce les bains, oct. 2013



Forêt de la Coubre, nov. 2013

Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Lactarius luteolus Peck

Synonyme : *L. kuehnerianus*

Nom français : *Lactaire salissant*

Souvent sous chênes, sur sol sablonneux du littoral, également à l'intérieur des terres. Chapeau feutré, blanchâtre puis ochracé à brunâtre sale. Lames blanchâtre crème, brunissant au froissement. Stipe blanc, brunissant. Odeur mêlée, fruitée et de crustacés. Lait assez abondant, blanc, séchant typiquement en brun noirâtre sur les lames. Spores 7,5-9 x 6-6,5 µm.

Ce lactaire, probablement rare dans notre région, est assez typique par son chapeau velouté et son brunissement. Nous l'avons rencontré en 2013 alors qu'il semblait n'avoir jamais été observé par le passé dans nos départements, nous sommes surpris par conséquent d'avoir réalisé de nouvelles récoltes en 2014 dans différents secteurs. De l'avis de notre collègue Jacques Guinberteau, qui le connaît bien dans plusieurs stations arrière-dunaires en Gironde: « *ce lactaire semble favorisé par le réchauffement climatique, et remonte le long de l'Atlantique avec les bouffées d'air chaud* ». Nous ne manquerons pas de compléter cette fiche dans les années à venir pour faire part de nos nouvelles constatations.


Biblio : littérature courante - GEPR p. 112



Pessines, oct. 2013



Ronce les bains, oct. 2013



Commune de Combiers ou Charras (16), août 2014



Juicq, août 2014