



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Entoloma paludicola (P.D. Orton) Romagn.

Synonyme probable : *E. parkensis*

Sous feuillus humides, dans les milieux marécageux. Chapeau 6-27 mm, brun sombre, plus clair avec l'âge, nettement strié, creusé au centre. Lames blanchâtres à grisâtre brunâtre. Stipe 10-30 mm, subconcolore au chapeau, lisse et brillant. Odeur et saveur farineuses. Spores (7)8-9,5(11) x 6-7,5 µm.

Avec une écologie similaire, à comparer avec :

- *E. caccabus* (ss. auct.) : plus grande taille, chapeau 10-40 mm non ou peu strié, odeur d'ail ;
- *E. bisporigerum* : sosie d'*E. caccabus*, basides bisporiques, spores 10-12 x 8-9,5 µm ;
- *E. politum* : odeur non farineuse, spores plus globuleuses ;
- *E. bryorum* (syn. *E. caccabus* ss. Noordel.) : stipe non lisse et fibrilleux.

Les récoltes présentées ont été réalisées en milieu marécageux ou en tourbière, sous saules et aulnes, majoritairement sur les communes de Montendre (17), Brossac et Brigueuil (16).

Biblio : bull. SMF 103, fasc. 2, 1987, p. 80-82 - Revista Catalana de Micologia, vol. 21, 1998.



