



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

## *Amanita echinocephala* (Vitt.) Quélet

Nom français : Amanite épineuse

Sous feuillus et conifères. Calcicole. Thermophile. Chapeau blanchâtre, verrues du chapeau pyramidales aiguës, régulièrement réparties avant leur chute. Lames blanc grisâtre à glauque verdâtre. Stipe concolore couvert en bas de verrues. Anneau ample à bord crénelé. Spores 8-11 x 6-8  $\mu\text{m}$ .

A comparer notamment avec :

- *A. echinocephala* var. *subbeillei* : lames beige saumoné ;
- *A. gracilior* : verrues du chapeau moins régulièrement réparties et plus concentrées au centre (espèce de taille parfois respectable contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, et à ce qui est indiqué dans la littérature, cf. cette fiche).

*A. echinocephala* type, contrairement à la var. *subbeillei*, nous semble moins fréquente, nous la rencontrons malgré tout presque tous les ans, par exemple dans les bois de Saintes, Lozay, etc.

Biblio : littérature courante - Neville et Poumarat (1995) Bull. FAMM 7-8 et (1996) Doc. Mycol. 26 (101).

*Fiche réalisée en février 2017 par Patrice TANCHAUD*

