



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Vittadini

Noms français : Amanite vaginée, Grisette

Sous *Fagaceae* (chêne, hêtre). Allure trapue. Chapeau 5-12 cm, vite étalé, mamelonné, gris à gris ochracé, brillant, marge striée. Lames blanches. Stipe blanc blanchâtre, parfois chiné, volve engainante blanche, non tachée. Spores rondes 10-12 µm. K-K négatif (réaction découverte par Kotilová-Kubickova, cf. fiche de présentation du genre *Amanita*). Ce groupe d'amanites à spores rondes est délicat, à comparer notamment avec :

- *A. coryli* : sous noisetiers, K-K positif ;
- *A. simulans* : sous peupliers et saules, stipe grisonnant, K-K positif ;
- *A. praelongipes* : sous chênes et hêtres, plus grande, chapeau châtain à gris brun pâissant, K-K négatif ;
- *A. betulae* : sous bouleaux, chapeau généralement plus coloré de brun roux, K-K positif.

Autres espèces présentant des couleurs plus ou moins approchantes, mais leurs spores sont elliptiques : *A. huijsmanii*, *A. dryophila*, *A. oblongispora*, *A. mairei*.

La répartition et la fréquence de cette amanite, prise dans son sens strict comme ici, est bien difficile à définir tant les espèces de ce groupe sont délicates à séparer.

Biblio : littérature courante.