



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

## *Coprinopsis stercorea* (Fr.) Redhead et coll.

Synonyme : *Coprinus stercoreus*

Sur excréments d'animaux. Petite espèce à chapeau couvert d'un voile floconneux blanchâtre. Stipe concolore, non radicant. Odeur forte de bitume mais pouvant être exceptionnellement absente. Voile constitué de cellules subsphériques avec verrues non solubles dans HCl (acide chlorhydrique), basides tétrasporiques et spores 6-8 x 3,5-4,5 µm, sans sac périsporique. A comparer notamment avec trois espèces ressemblantes :

- *C. tuberosa* : présente un sclérote à sa base et son odeur rappelle celle de la pomme de terre ;
- *C. foetidella* : dimensions sporales supérieures ;
- *C. trispora* : basides trisporiques.

Espèce visible à différents moments de l'année et probablement assez fréquente, nous l'avons observée par exemple à Saintes, La Chapelle des Pots, St Sornin, La Gripperie St Symphorien, Sireuil (16), ...

Biblio : Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrhard Ludwig, Pilzkompendium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin) - BK4 303 - Fungi fimicoli Italici F. Doveri.

