



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

Mycena cyanorrhiza Quélet

Sur bois mort ou écorce de conifères. Chapeau finement pubescent, strié, gris blanchâtre à gris brunâtre. Lames blanchâtres, arête séparable. Stipe gris blanchâtre, finement pubescent, base intensément et typiquement bleue. Odeur sans particularité. Spores 6,5-9 x 4-5 µm, cheilocystides ornées d'excroissances digitées. A comparer avec :

- *M. amicta* : marge du chapeau bleue sur les jeunes exemplaires, cheilocystides fusiformes ;
- *M. pseudocyanorrhiza* : taxon décrit dans l'ouvrage de Robich, mais pouvant paraître bien délicat à séparer, qui se distinguerait par un stipe plus long, l'arête des lames non séparable et des spores légèrement supérieures (9-11 x 6-7 µm).

Notre récolte a été réalisée en novembre 2011 sur la commune de Bois-Plage-en-Ré, parmi des débris de pin mort. Nous n'avons pas constaté que l'arête des lames était séparable, et les spores observées mesuraient 7,5-9,5(10) x 4,5-5,5 µm. Nous avons longuement hésité pour baptiser cette récolte, mais à la lecture de l'ouvrage d'Aronsen et Laessle édité en 2016, où seul *M. cyanorrhiza* est décrit, il nous paraît raisonnable d'envisager « tout simplement » ce binôme.

Biblio : littérature courante - *Mycena* d'Europa Robich - *Mycena* s.l. Aronsen & Laessle.