



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinellus hiascens (Fr. : Fr.) Redhead et coll.

Synonyme : *Coprinus hiascens*

Terrestre, souvent en touffe. Chapeau brun ochracé, marge pâle. Stipe blanc. Spores 7,5-12 x 4-6 µm à base tronquée et pore germinatif central. Présence sur le chapeau de soies piléiques à col atténué et d'éléments cylindriques composant le voile (fugace), sphérocytes absents. Cheilocystides lagéniformes, pleurocystides absentes. Microscopie très complète (avec présence d'exemplaires jeunes) indispensable. Section où les espèces sont très nombreuses, à comparer notamment avec *C. impatiens* qui est dépourvu de voile, ses spores sont légèrement plus larges et à base arrondie, également ses cheilocystides sont plus en pointe.

Espèce peut-être assez commune mais dont la détermination passe impérativement par la microscopie. Nous l'observons occasionnellement sur nos secteurs de prospection.

Biblio : Littérature courante - Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrhard Ludwig, Pilzkompodium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin).