



Ordre : Tricholomatales

Famille : Lyophyllaceae

## *Tephrocyste baeosperma* (Romagn.) Moser

Synonyme : *Lyophyllum baeospermum*

En forêts. Chapeau 22-50 mm, brillant, brun gris plus ou moins sombre sur le frais, bords plus clairs, strié par transparence, chamois par temps sec. Lames grisâtre pâle, immuables. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur forte de farine. Basides 20-28 x 5-6  $\mu\text{m}$ , spores lisses 4-5 x 2,5-3  $\mu\text{m}$ , piléipellis en cutis plat.

La récolte présentée ici a été réalisée en novembre 2009 sur la commune du Bois-Plage en Ré. Le chapeau le plus grand atteignait 20 mm, l'odeur et la saveur étaient farineuses. La microscopie nous a montré des basides tétrasporiques 25-30 x 5-5,5  $\mu\text{m}$  et des spores 4,5-5 x 3(3,5)  $\mu\text{m}$ , nous n'avons pas vu de cheilocystides. Nous remercions M. Pierre-Arthur Moreau pour son aide apportée à la détermination de cette récolte et pour ses éclaircissements sur ce binôme controversé et parfois mal interprété.

Biblio : Rivista di Micologia, 2002 - DM HS n° 5

*Fiche réalisée en septembre 2013 par Patrice TANCHAUD*