



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

## *Mycenella trachyspora* (Rea) Boekhout

Synonyme ? (études toujours en cours) : *M. rubropunctata*

Terrestre ou sur bois. Chapeau gris brunâtre à gris souris. Lames blanchâtre crème pouvant être ponctuées de brun rougeâtre à maturité. Stipe très prumineux, blanchâtre au sommet et plus sombre en bas. Spores 4,5-6  $\mu\text{m}$ , bossues. Cheilocystides lagéniformes à subcylindriques, à sommet fusiforme parfois mucroné. Hyphes du revêtement du stipe diverticulées (toujours ?).

A comparer principalement avec *M. bryophila* : absence de ponctuations rougeâtres, cheilocystides lagéniformes avec un long col cylindrique à sommet arrondi.

Une certaine confusion semble régner dans ce genre avec les espèces à spores bossues. Il ne fait guère de doute que des études à venir bouleverseront probablement ce petit groupe. Nous avons plusieurs récoltes que nous rattachons à cette espèce, qui reste peu fréquente dans la région, présente aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres.






Biblio : Bull. FMBDS 1999 n° 154 - Pilzk. 1 - Funga nordica - Champignons d'Europe tempérée, Læssøe & H. Petersen.


*Fiche réalisée en juillet 2024 par Patrice TANCHAUD*



*cheilos*      *stipe*









*Saintes, déc. 2015*

