



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Psathyrella fibrillosa (Pers.) Maire

Synonyme : *P. artemisiae*

Parmi les débris de bois et de feuilles en forêt. Chapeau brun rougeâtre sombre pâlisant à maturité, couvert de fibrilles méchuleuses blanches surtout persistantes à la marge. Lames gris ochracé, brunes à maturité. Stipe fibrillo-laineux de blanchâtre, armillé dans la jeunesse. Spores 7,5-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides et pleurocystides nombreuses, fusiformes à lagéniformes avec un long col à sommet aigu, à parois assez épaissies.

A comparer surtout avec :

- *P. impexa* : cystides plus polymorphes, lagéniformes avec un col plus obtus, ou ventruées, parfois fourchues ;
- *P. squamosa*, rare espèce à spores plus petites et cystides ventruées.

Psathyrelle probablement peu fréquente dans la région, rencontrée à ce jour à deux reprises :

- à gauche : en forêt de Cellefrouin en octobre 2015, parmi des débris de conifères ;
- à droite : dans les bois de Brigeuil en octobre 2019, sous feuillus.

Biblio : littérature courante - Pilzk. 2 E. Ludwig - Funga nordica.