



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Scutellinia sinensis M.H. Liu

Sur terre. Apothécie 1-2,2 mm, rouge à orange-rouge, marge poilue. Poils brunâtres de longueur assez variable, 135-650(840) μm , à base simple, bifurquée ou multifurquée. Spores sphériques 16-19,5 μm , couvertes de grosses verrues arrondies mêlées à d'autres plus petites.

S. tuberculata est une espèce proche dont les différences sporales paraissent bien ténues et peu convaincantes, une synonymie serait peut-être à envisager mais elle reste pour le moment uniquement théorique.

A comparer également avec *S. citrina* (égal *S. paludicola*), *S. hyperborea* et *S. minor* qui ont des poils plus courts et des spores à ornementation plus basse.

Espèce de création assez récente (1996), vraisemblablement très rare, que nous avons eu le plaisir d'étudier lors des mois d'avril et de mai 2016, suite à une récolte dans un vieux verger sous pommiers, sur terre nue, route de la Pichauderie sur la commune de Saintes. Nous avons pu observer une cinquantaine d'apothécies, toutes de très petite taille, atteignant au plus 2 mm. La microscopie nous a montré des poils de différentes dimensions, allant jusqu'à 800 μm ; quant aux spores, elles mesuraient 17,5-19,5 μm sans l'ornementation, et elles se rapprochent aussi bien de *S. sinensis* que de *S. tuberculata*.

Biblio : Mycotaxon 79 (2001) p. 177-179 - Osterr. Z. Pilzk. 19 (2010) p. 24-25.

