



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius propinquus* Eyssartier & Bidaud

En forêt (écologie restant probablement à définir). Chapeau 40-75 mm, légèrement lubrifié puis sec, fibrilleux radialement et micacé, gris bleuâtre au départ, rapidement crème beigeasse terne. Lames assez espacées, ochracé rouillé, arête pâle. Stipe subcylindrique, fibrilleux sur la longueur, à reflets moirés, se terminant par un bulbe remarquablement marginé à turbiné. Chair blanchâtre à grisâtre, odeur faiblement fruitée et saveur douce. KOH sans particularité. Spores 7-9 x 5-6 µm assez verruqueuses.

Cortinaire du Sous-genre *Dermocybe*, Section *Sericeocybe*, Série *Alboviolaceus*. Dans la même Section, nous pouvons trouver par exemple *C. malachus*, *C. pseudomalachus* et *C. obliquus*, espèces s'éloignant nettement de notre récolte qui est une réplique parfaite de l'iconographie de la planche n° 369 de l'ADC, ou vice-versa ... Reste néanmoins *C. quarciticus* qui, bien que paraissant distinct, pourrait dans l'avenir s'avérer être le même taxon.

Une fois n'est pas coutume, nous présentons une récolte réalisée en limite de « nos terres de prédilection », sur « celles » limitrophes de notre ami Jacques Guinberteau, en novembre 2011 au Verdon (33), sous chênes verts et pins. Nous avons eu en effet le plaisir d'y dénicher cette rare espèce pour laquelle M. Guillaume Eyssartier (un des ses créateurs) nous répondra : « à mon avis, c'est la seule photo de ce taxon, avec la mienne ... ».

Biblio : ADC Bidaud et al.