



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius magicus Eichhorn

Synonymes probables : *C. olidovolvatus*, *C. scaurocaninus*

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau visqueux, vite sec, vert olive puis brun-fauve, couvert radialement de fibrilles brunes innées, présence parfois de voile blanchâtre crème sur le chapeau ou vers la marge. Lames bleu-mauve à beige lilacin. Stipe bleuté, garni de fibrilles enchevêtrées, parfois denses vers la base (pseudovolve) ; bulbe conique. Chair blanchâtre à jaunâtre, bleutée au sommet du stipe. Odeur terreuse ou de barbe de maïs, saveur douceâtre. KOH brun-jaune à orangé sur la cuticule. Spores 7-9 x 4,5-5,5 µm.

A comparer avec :

- *C. glaucopus* : plutôt sous conifères, presque inodore ;
- *C. parherpeticus* (syn. *C. luhmannii*) : chapeau couvert de restes de voile crème jaunâtre, lames bleutées (épithète qui pourrait éventuellement être retenue pour quelques-unes de nos récoltes ?).

Ce cortinaire n'est pas rare, nous le rencontrons tous les ans dans nos forêts de feuillus, souvent également sous chênes verts.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.





