



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Melastiza flavorubens (Rehm) Pfister & Korf

Sur le sol. Apothécies rouges à rouge orangé, poils bruns à la marge, courts et obtus sous le microscope. Spores 15-18 x 7-9 μm avec un réseau irrégulier, incomplet et pourvu de nœuds aux angles des mailles (à mettre en évidence dans le bleu coton ou/et la phloxine).

A comparer avec quelques espèces ressemblantes, notamment :

- *M. cornubiensis* : apothécies orange, spores avec un réseau complet ;
- *M. boudieri* : spores 16,5-19,5 x 9,5-12,5 μm (sans ornementation) avec de grosses pustules irrégulièrement réparties et fortement agglomérées aux pôles ;
- *Scutellinia pseudotrechispora* : spores ornées de crêtes formant un réseau presque complet (18-21 x 11-13,5 μm), présence de courts poils bruns (120-320 μm) à sommet aigu et base simple ou bifurquée (typiques du genre).

Cet ascomycète est peu fréquent, nous l'avons occasionnellement rencontré en Charente-Maritime durant les mois de juin et juillet, généralement sur bord de chemins dans en forêts.

Biblio : DM 42 p. 1-45 (1980).



