



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

## *Cortinarius chailluzii* Frøslev & T. S. Jeppesen

Sous hêtres, charmes ou chênes, sur sol calcaire. Chapeau jaune brillant vers la marge, centre plus sombre, ochracé brun. Lames grisâtre violet. Stipe blanchâtre, parfois violacé au sommet, avec un bulbe marginé. Chair blanchâtre. Odeur et saveur sans particularité. KOH rose-rouge à rouge brun sur la cuticule et le bulbe, nul à rosâtre pâle sur la chair. Spores 9,5-10 x 5,5-6,5 µm. Voir les fiches de *C. cisticola* et *C. ochraceopallescens* pour les espèces ressemblantes.

Nous remercions vivement M. Guillaume Eyssartier de nous avoir confirmé que nous étions en présence de ce taxon peu connu, mais peut-être souvent délaissé dans ce groupe délicat des *Calochroi*. Notre récolte a été réalisée en septembre 2013 dans les bois de St Quentin de Chalais.

Biblio : Mycological research 110 p. 1046-1058 (2006) - Bull. S.M. Périgord n° 42 (mai 2015) - DM 36 (2015).

Fiche réalisée en août 2016 par Patrice TANCHAUD