



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius subferrugineoides Reumaux

Synonyme : *C. disjungendus* ss. auct.

Sous bouleaux. Chapeau hygrophane, micacé à fibrilleux de blanc dans la jeunesse, sur fond brun rougeâtre à brun roussâtre puis brun-gris. Lames ochracées puis brun rouillé. Stipe brunâtre plus ou moins voilé de blanchâtre argenté, typiquement ferme. Chair brunâtre, odeur et saveur sans particularité. Spores 9-12 x 6-7 μm .

La prudence reste de mise avec ces cortinaires difficiles à déterminer car de nombreuses taxons gravitent autour. Avec la même écologie, citons par exemple :

- *C. conicosordescens* : chapeau beige roussâtre, non hygrophane et nettement mamelonné ;
- *C. subbalaustinus* : chapeau aux couleurs vives et spores plus petites.

Cortinaire visible dans son écologie de prédilection, surtout l'automne ; nous l'avons rencontré par exemple dans les boulaies de Massignac et Brigueuil en Charente (photographies ci-dessus) et sous bouleaux dans un bois à Plassay (Charente-Maritime, cf. page 2).

Biblio : ADC Bidaud et al. - GEPR.

