



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius decipiens* (Pers. : Fr.) Fr.

Nom français : Cortinaire trompeur

Sous feuillus, souvent dans les milieux humides. Chapeau hygrophane, brun-gris à brun chocolat sombre, un peu voilé de blanc vers la marge. Lames brun grisâtre un peu violacé, puis brun rouillé. Stipe violacé au sommet, voilé de blanchâtre sur fond grisâtre ochracé, brun rougeâtre à la manipulation. Chair brun grisâtre, plus ou moins violacée au sommet du stipe. Odeur et saveur sans particularité. Spores 8-10 x 5-6 µm. A comparer par exemple avec :

- *C. decipiens* var. *atrocoeruleus* : voile plus abondant à la marge du chapeau ;
- *C. alnetorum* : sous aulnes, épais voile grisâtre sur le chapeau, chair brun-gris sombre.

Ce cortinaire du Sous-genre *Hydrocybe* est assez fréquent dans son écologie, nous le rencontrons par exemple autour des étangs dans le secteur de Cadeuil, sur les communes de Ste Gemme et La Gripperie St Symphorien.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.