



Ordre : *Cantharellales*

Famille : *Hydnaceae*

Hydnum ovoideisporum Olariaga, Grebenc, Salcedo & M.P. Martin

En forêt sur sol calcaire. Chapeau 12-40 mm, brun-orange à orange foncé, marge plus pâle. Stipe blanchâtre à ochracé, central à légèrement excentré. Aiguillons non décurrents, coniques et aigus. Saveur douce puis amère. Spores ovoïdes 8-10 x 6-7,5 µm. A comparer avec :

- *H. vesterholtii* : écologie similaire, chapeau ochracé dépourvu de tons orangés et aiguillons souvent décurrents ;
- *H. ellipsosporum* : spores elliptiques à presque cylindriformes, 9-11(12) x 6-7 µm ;
- *H. rufescens* : chapeau ochracé orangé plus pâle, aiguillons spatulés et spores globuleuses à subglobuleuses.

Taxon de création récente (2012) caractérisé par ses teintes vives et ses spores ovoïdes. Il n'est peut-être pas rare dans notre région où son écologie de prédilection est dominante, souvent d'ailleurs où pousse *Hydnum albidum*. Nous n'hésiterons pas à apporter ici de nouveaux éléments à l'aide de récoltes que nous pourrons réaliser dans les années à venir.

Biblio : Mycologia, 104(6), 2012, p. 1443-1455.

Fiche réalisée en décembre 2016 par Patrice TANCHAUD