



Ordre : *Leotiales*

Famille : *Hyaloscyphaceae*

## *Calycellina flaveola* (Cooke) Baral & P. Blank

Synonymes : *Pezizella flaveola*, *Urceolella flaveola*

Sur frondaisons mortes de fougère aigle (*Pteridium aquilinum*). Apothécies sessiles, 0,2-0,6 mm, jaunes, marge garnie de poils blancs. Spores guttulées 11,5-15 x 2,5-3  $\mu$ m. Asques tétrasporiques. Paraphyses contenant des vacuoles réfringentes jaune d'or. Poils de la marge à sommet longuement filiforme plus ou moins tortueux. A comparer avec *C. ochracea* : sur bois ou cupules, spores (13)16-21(24) x 4-4,5  $\mu$ m cloisonnées, paraphyses avec de nombreuses guttules réfringentes.

Ce petit ascomycète ne peut être déniché que lors de recherches orientées dans son écologie de prédilection, où il est parfois visible en assez grande quantité. Nous l'avons récolté à plusieurs reprises en Charente-Maritime et Charente, il a été observé par le passé sur l'île de Ré par M. Michel Hairaud.

Biblio : DVD H.O. Baral.

*Fiche réalisée en avril 2018 par Patrice TANCHAUD*