



Ordre : Cortinariales

Famille : Hymenogasteraceae

## *Hebeloma subtortum* P. Karst.

Synonymes : *H. malençonii*, *H. pallidum*, *H. sordidum*

Sous chênes verts ou cèdres, dans les régions chaudes. Chapeau visqueux, blanchâtre crème, marge pâle et voilée dans la jeunesse. Lames blanches puis brunâtres. Stipe subconcolore au chapeau, pelucheux à fibrilleux, cortine nette pouvant former une zone annulaire. Odeur mêlée de rave et de cacao. Spores 8-12,5 x 5-7 µm, non dextrinoïdes. Cheilocystides présentes.

*H. mesophaeum* est une espèce proche qui se distingue par sa stature plus grêle et un chapeau plus sombre au centre. *H. collariatum* peut également ressembler, mais il est lié aux saules.

Nous connaissons cet hébélome sur différents emplacements sous chênes verts, par exemple dans les secteurs de Saintes, Fouras, Ronce les bains, etc. il peut apparaître entre les mois de septembre et de décembre, et souvent en grand nombre.

Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage de la récolte page 2.

Biblio : Fungi Europaei 14 Beker, Eberhardt & Vesterholt (2016) - GEPR.



