



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Strophariaceae*

Stropharia pseudocyanea (Desm. : Fr.) Morgan

Synonymes : *S. albocyanea*, *S. ochrocyanea*

Nom français : Strophaire blanc bleuté

En milieux herbeux, parfois dans les dunes. Chapeau 2-4 cm, un peu visqueux, sans voile, bleu verdâtre pâle à blanc jaunâtre, marge sans restes de voile. Lames beige rosé à brunâtre lilacin, arête blanche. Stipe blanc bleuté à ochracé, avec une zone de cortine fugace. Spores 7-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides capitées nombreuses. Chrysocystides présentes uniquement sur la face des lames.

Pour notre région, à comparer avec deux espèces de taille supérieure, à chapeau visqueux, plus bleu et nettement voilé :

- *S. aeruginosa* : voile abondant, anneau membraneux, arête des lames blanche, cheilocystides et chrysocystides similaires ;
- *S. caerulea* : arête des lames concolore, cheilocystides absentes, présence de chrysocystides sur l'arête et la face des lames ;

Espèce peu fréquente à nos yeux, vis-à-vis des deux autres citées ci-dessus. Nos récoltes ont été réalisées l'automne sur les communes de Ste Gemme (photographie à gauche) et Brigueuil (photographie à droite).

Biblio : littérature courante.