

Hermitain, oct. 2009
Leg. Jean Robert



Forêt de La Chapelle-Bâton (79)
oct. 2015, Leg. Suzanne Buissonnet



Ile d'Oléron, sept. 2024
Leg. Olivier Balan

Ordre : Boletales

Famille : Boletaceae

Buchwaldoboletus lignicola (Kallenbach) Pilát

Synonyme : *Pulveroboletus lignicola*

Nom français : Bolet lignicole

Saprophyte sur conifères pourris. Chapeau velouté, fauve, brun-jaune orangé, fauve olivâtre à brun rougeâtre. Pores décurrents, jaune vif, verdissant puis bleuissant au toucher. Stipe subconcolore au chapeau avec le sommet jaune vif, mycélium jaune. Chair crème jaunâtre dans le chapeau et jaune vif à la base du stipe. Spores 6-10 x 3-4,5 µm.

Une autre espèce saprophyte (et non mycorhizique comme la majorité des bolets) est *B. hemichrysus*, il s'en distingue par une taille supérieure, un chapeau visqueux avec des couleurs éclatantes et des pores non décurrents.

Bolet probablement rare dans la région dont nous signalons trois récoltes réalisées par des collègues.

Biblio : littérature courante.

Fiche réalisée en septembre 2024 et Patrice TANCHAUD