



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius pseudodaulnoyae R. Henry & Ramm

Synonymes : *C. daulnoyae* var. *pseudodaulnoyae*, *C. squamosocephalus*

Sous feuillus. Chapeau visqueux, violet mauve vif parcouru de fibrilles radiales brun roussâtre, centre décolorant en roux-orangé. Lames argilacées avec un reflet mauve au bord. Stipe blanc, finement fibrilleux, base bulbeuse et en pointe. Chair blanchâtre, violacée dans le chapeau et au sommet du stipe. Odeur terreuse et saveur douce. KOH jaune orangé sur cuticule, jaune sur chair. Spores 9,5-12 x 6-7 µm nettement verruqueuses.

Pour comparaison, voir les fiches de *C. daulnoyae*, *C. balteatocumatilis* et *C. largus*.

A ce jour nous avons deux récoltes de cette rare espèce :

- à gauche, dans les bois de Champagne en octobre 2008 ;
- à droite, en forêt de Brigueuil en septembre 2017.

Biblio : Marchand, planche n° 705 tome 8 (sous le nom de *C. daulnoyae*) - DM 21 (83), 1991 - ADC Bidaud et al. - Journal des J.E.C. n° 18 (2016).