



Ordre : Agaricales

Famille : Agaricaceae

## *Agaricus coniferarum* Guinb. & Callac

Sous conifères tels que cèdres, cyprès, genévriers, et exceptionnellement sous chênes. Chapeau couvert de fibrilles laineuses, brun-roux puis brun sombre, mais parfois peu coloré ; marge appendiculée de restes de voile. Lames blanches, brun-rose puis brun sombre. Stipe blanc lavé de brun rosâtre, méchuleux à laineux sous l'anneau. Chair orange puis rouge fuligineux à la manipulation. Odeur sans particularité. Spores 7-8,5 x 4,5-6 µm. Arête garnie de cystides clavées. La description dans l'article cité ci-dessous compare cette espèce à *A. subperonatus*, *A. lanipes*, *A. bohusii* et *A. capensis*.

Nous présentons ici la récolte d'une forme pâle de cet agaric, observé en décembre 2011, sous cyprès de lambert, chemin des Evières au Bois-Plage sur l'île de Ré.

Nous remercions vivement M. Jacques Guinberteau, spécialiste du genre et un des auteurs de ce taxon très récemment décrit, pour l'aide apportée à la détermination de cette récolte.

Bibli : Fungal biology n° 30 (2017) 1-18.

*Fiche réalisée en décembre 2017 par Patrice TANCHAUD*