



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Melanoleuca paedida f. electropoda (Maire et Malençon) Fontenla, Para et Vizzini

Synonymes : *M. electropoda*, *M. rufipes* ss. Bon

Dans les milieux herbeux ou boisés, sous chênes verts, cyprès, cistes. Chapeau 3-5,5 cm, convexe, rapidement plat à déprimé, brun fauve à roux ocre orangé. Lames blanchâtres à crème jaunâtre. Stipe subconcolore au chapeau puis brun noirâtre. Odeur et saveur sans particularité. Chair ochracée, brun rougeâtre dans la moitié inférieure. Spores 6-10 x 4,5-6,5 µm, subgloboseuses à ellipsoïdales avec de fortes verrues isolées plus ou moins régulières. Cheilocystides en poils d'ortie à col un peu tortueux.

Nous sommes dans un groupe où les taxons ont été différemment interprétés selon les auteurs, par conséquent il est plus aisé de s'en sortir en se contentant d'études récentes (2011 et 2012) comme nous le faisons ici.

L'espèce type, *M. paedida* (synonyme *M. metrodiana*) se distingue par son chapeau gris-brun.

Taxon assez bien caractérisé par ses couleurs vives et confirmé par sa microscopie, nous l'avons récolté en septembre 2017 sur la commune de Ste Gemme.

Biblio : DM HS n° 2 - Mycotaxon 118 p. 361-381 (2011) - Revista Catalana de Micologia vol. 34 p. 19-41 (2012).