



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Cystodermataceae*

Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod

Nom français : Cystoderme requin

Souvent sous conifères, parmi les mousses. Chapeau 1-7 cm, beige rosé, grisâtre rosé à blanchâtre, granuleux, avec la marge plus ou moins garnie de lambeaux de voile. Lames blanc crème. Stipe concolore au chapeau couvert d'une armille floconneuse, avec un anneau ample au sommet formant un bourrelet. Odeur nette de terre. Spores 4-5,5 x 3-4 µm.

C. carcharias var. *fallax* est une variété brun ocre pouvant rappeler *C. amianthinum*, mais ce dernier ne possède pas de bourrelet net au sommet de l'armille.

A noter l'existence de deux espèces parasites qui se développent parfois sur ce cystoderme (ainsi que sur *C. amianthinum*) :

- *Squamanita paradoxa* : rare, chapeau gris lilas couvert de squames généralement apprimées, stipe concolore au sommet, chlamydospores lisses ;
- *Squamanita pearsonii* : très très rare, chapeau avec des squames dressées, chlamydospores à surface finement crevassée.

Espèce peu fréquente dans la région dont nous n'avons qu'une récolte, réalisée en octobre 2024, sur une écorce moussue de conifère (douglas ou épicéa) en forêt de Brigueuil.

Biblio : littérature courante.