



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Dermolomataceae*

## ***Hodophilus atropunctus*** (Pers. : Fr.) Birkebak & Adamčík

Synonyme : *Camarophyllopsis atropuncta*

En milieu frais sous feuillus. Chapeau 10-25 mm, mat, souvent irrégulier ou craquelé, brun grisâtre avec la marge plus pâle. Lames plus ou moins gris brunâtre, décourbées et espacées. Stipe subconcolore au chapeau, nettement ponctué de brun-noir. Spores 5-6 x 4-4,5 µm. Epicutis hyméniforme.

A comparer avec les espèces du même genre, notamment :

- *H. albofloccipes* : stipe jaune ponctué de granulations blanchâtres, odeur forte comme chez *H. foetens* ;
- *Hodophilus phaeophyllus* (en attente de placement officiel dans ce genre) : lames gris-brun sombre et stipe brun rougeâtre (parfois légèrement ponctué mais moins contrasté) ;
- *H. anatinus*, *H. phaeoxanthus*, *H. micaceus* : stipe plus ou moins jaune pour les deux premiers, très jaune vif pour le dernier.

Bien que cette espèce ne semble pas très fréquente, nous avons le plaisir de la rencontrer occasionnellement l'automne, par exemple dans les secteurs de Saintes La Chapelle des Pots et Cozes.

Biblio : littérature courante - Mycologia 108 (5) : 867 (2016).

*Fiche réalisée en septembre 2019 par Patrice TANCHAUD*



