



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

## *Xerocomellus cisalpinus* (Simonini et coll.) Klofac

Synonyme : *Xerocomus cisalpinus*

Sous chênes, parfois sous hêtres et pins. Chapeau variable, crème ochracé à brun rougeâtre, rapidement fissuré ou craquelé et laissant apparaître le chair sous-jacente rose rougeâtre. Pores jaunes légèrement bleuissants. Stipe jaune teinté de rouge en bas. Chair pâle dans le chapeau, jaune dans le stipe, avec un net bleuissement limité au stipe remontant par la base. Spores 11-15 x 4,5-5 µm striées (stries visibles en microscopie optique).

A comparer surtout avec :

- *X. chrysenteron* : sous conifères, exceptionnellement sous hêtres, chair immuable ou peu bleuissante, stipe avec des teintes vineux rougeâtre ;
- *X. pruinatus* : chapeau non craquelé généralement brun sombre à brun noirâtre, chair non bleuissante ou seulement faiblement à la base du stipe ;
- *Xerocomus communis* : présence de petites piqûres rouge orangé à la base du stipe.

L'espèce présentée ici a été récemment décrite (2003), à ce jour nous ne l'avons observée que sur le littoral, en forêt de La Coubre et de La Palmyre, entre les mois de septembre et de novembre.

Biblio : *Xerocomus* H. Ladurner & G. Simonini - GEPR.



**↑ Aussitôt  
après la coupe**



**5 minutes  
↓ après la coupe**



