



Bryoscyphus sp. 1

Ascomycète apparemment non décrit à ce jour, ayant également fait l'objet d'une publication provisoire par notre ami Michel Hairaud dans le bulletin SMMA n° 31 de 2013, pages 54-55. Nos récoltes ont été réalisées sur mousses dans différents secteurs :

- ci-dessus à gauche : Port d'Envaux sur place à feu, janvier 2011 ;
- ci-dessus à droite : Ste Gemme en milieu incendié, décembre 2011 ;
- page 2 en haut : Le Bois-plage-en-Ré sur mousse d'un tronc couché de *Cupressus*, décembre 2012 ;
- page 2 en bas : La Palmyre sur place à feu, décembre 2013.

Apothécie 1-2 mm, jaune, marge plus ou moins irrégulière à maturité. Stipe blanchâtre. Microscopie :

- spores (11)14-16,5(22) x (2,5)3,3-3,6(4) μm , hyalines, fusiformes à scutuloides, garnies de guttules réfringentes, parfois cloisonnées à maturation avancée ;
- asques 80-145 μm , sommet amyloïde rappelant le genre *Hymenoscyphus*, base avec crochet ;
- paraphyses filiformes garnies de guttules réfringentes ;
- excipulum ectal de textura prismatica et excipulum medullaire de textura plus ou moins intricata.

A noter une certaine ressemblance avec :

- *Hymenoscyphus epiphyllus* : écologie différente, spores légèrement plus larges ;
- *Bryoscyphus phascoides* (syn. : *Hymenoscyphus phascoides*) : spores ressemblantes mais apothécies plus petites et blanches.

