



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius epipurrus Chevassut & R. Henry

Surtout sous chênes-verts. Chapeau 2,5-6 cm, conique puis conico-convexe, souvent avec un large mamelon central ; revêtement piléique mat, sec, hygrophane, brun châtain à brunfauve, plus clair en séchant et parfois maculé de taches brun noirâtre avec l'âge ; présence vers la marge d'un léger voile crème assez persistant. Lames plutôt espacées, ocre puis rouillées. Stipe brunfauve, plus sombre en bas, peu cortiné, avec la base atténuée et radicante. Chair pâle au sommet, brun-roux dans la moitié inférieure du stipe. Odeur un peu terreuse, saveur douce. KOH vineux sur la cuticule et la chair du chapeau, violet-noir en bas du stipe (extérieur et chair). Spores 7,5-9(10) x 5-6(6,5) μm , fortement verruqueuses. A comparer par exemple avec :

- *C. sordescitipes* : chapeau moins vivement coloré avec un voile plus important, spores 8-11 x 5,5-7 μm ;
- *C. hinnuleoradicatus* : surtout sous chênes-lièges, plus charnu, couleurs plus ternes.

Ce cortinaire appartient à l'ingrate Section des *Hinnulei* où les récoltes ne se ressemblent jamais, mais sans réellement que nous sachions s'il s'agit d'espèces différentes. A défaut de trouver notre bonheur dans l'ADC de A. Bidaud et al., ce taxon nous a été suggéré avec les réserves d'usage par M. Guillaume Eyssartier (que nous remercions vivement pour son partage régulier de ses connaissances). Nous avons plusieurs récoltes paraissant s'y rapporter, toutes réalisées l'automne sur différents secteurs du littoral et de l'intérieur des terres, toujours sous chênes-verts ou chênes à feuilles caduques, avec des spores mesurant 8-9(9,5) x 5-6 μm . Nous sommes conforté dans cette détermination par le fait que les auteurs indiquent que cette espèce est assez répandue.

Biblio : DM n° 8, fasc. 32, p. 70-72 - Bull. FAMM n° 20, 2001.

Fiche réalisée en avril 2025 par Patrice TANCHAUD





