



Ordre : *Tuberales*

Famille : *Tuberaceae*

Choiromyces venosus (Fr.) Fr.

Synonyme : *C. meandriiformis*

Semi-hypogé, sous feuillus ou conifères, plutôt sur sol argileux. Carpophore 3-10 cm, tuberculeux, gris blanchâtre à ochracé brunâtre, lisse à rugueux. Chair longtemps pâle, marbrée de blanchâtre crème à rose brunâtre, veinée de blanc. Odeur fruitée à désagréable. Spores jaunâtre pâle 16-22 μm avec des épines tronquées de 2,5-5 μm .

A comparer par exemple avec trois espèces pâles :

- *C. magnusii* : méditerranéen, surtout sous cistes, spores non épineuses mais seulement ridées ;
- *Tuber borchii* (syn. *T. albidum*) : spores elliptiques réticulées ;
- *Tuber magnatum* : spores elliptiques 25-50 x 20-40 μm avec un réseau à larges mailles.

Cet ascomycète, déjà observé en Charente, est probablement peu fréquent dans la région. Nous devons cette récolte à Marie-Pierre, notre épouse, qui a aperçu le champignon à fleur de sol dans les bois de Juillaguet, sous majorité châtaigniers en juin 2016.

Biblio : Champignons de France et d'Europe occidentale, M. Bon p. 334 - Guide Vigot p. 664 - Cetto n° 1236.