



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe griseotarda Poirier

Synonyme probable : *I. psammobrunnea*

Sous pins, parfois sous cèdres. Chapeau 2-6 cm, obtus, couvert d'un épais voile blanc grisâtre, fond ochracé cuivré parfois olivacé. Lames gris brunâtre olivacé. Stipe blanc rosé, ochracé avec l'âge, pruineux au sommet, base peu à légèrement bulbeuse. Chair blanche, odeur herbacée. Spores 10-11 x 5-6 µm. Cystides métuloïdes sur les lames et nombreuses sur la moitié supérieure du stipe.

A comparer avec deux sosies :

- *I. griseovelata* : phylogénétiquement proche, chapeau plus sombre couvert d'un voile gris-beige, caulocystides métuloïdes absentes ;
- *I. costinii* : récemment décrit de Croatie et phylogénétiquement éloigné, moins robuste, odeur spermatique, spores subamygdaliformes.

Nous remercions vivement M. Guillaume Eyssartier de nous avoir mis sur la piste de ce taxon peu connu et par conséquent rarement cité, décrit par Jacques Poirier en 2002. Nos inocybes y ressemblent en tous points, nous les avons observés à plusieurs reprises, l'automne et lors d'hivers doux, sous pins sur la commune de Corme-Royal. Les chapeaux peuvent atteindre 55 mm, les caulocystides métuloïdes sont nombreuses, et les spores mesurent 9-10 x 5-6,5 µm.

Biblio : DM 31 fasc. 124 (2002).