



Leucoagaricus babosiae Bon

Ordre : *Agaricales*

Famille : *Secotiaceae*

Sous feuillus ou conifères. Chapeau brun rosâtre à purpurin ou lilacin. Lames pâles, brunissantes. Stipe subégal ou un peu clavé, anneau fugace. La cuticule verdit sous l'effet de l'ammoniaque, elle rosit/rougit au frottement puis brunit, tout comme le stipe. Il est morphologiquement proche de *Leucoagaricus jubilaei* et s'en distingue par ses cheilocystides (contrôle microscopique indispensable), qui sont à sommet appendiculé plus ou moins étranglé.

Rare espèce, dont nous n'avons que deux récoltes réalisées dans le secteur de Rivedoux sur l'île de Ré, (avec réaction positive à l'ammoniaque) :

- à gauche leg. P. Tanchaud, en janvier 2007 sous *Cupressus* ;
- à droite leg. J. Robert, en novembre 2011 sur un chemin en bordure de forêt mixte.

Nous remercions M. Jacques Guinberteau pour leur identification et les informations qu'il a bien voulu nous communiquer. Il nous signale également ses récoltes de cette rare espèce :

- sur le littoral vendéen (Notre Dame de Monts) à partir des années 1990, notamment en dunes littorales boisées sous couvert de *Cupressus macrocarpa* ;
- en novembre 2002, sur son territoire girondin à la Pointe de Grave (Médoc) ;
- En novembre 2009, en compagnie de M. Guy Dupuy, dans un parc en dune boisée à St Trojan (Ile d'Oléron) avec mimosa + *Pino-Quercetum*.

Biblio : DM HS n° 3 - RDM 2004-1 (75-79)

Fiche réalisée en février 2012 par Jean ROBERT et Patrice TANCHAUD