



Ordre : Tricholomatales

Famille : Lyophyllaceae

## *Lyophyllum baeospermum* Romagn.

Synonyme : *Tephroclype baeosperma*

En forêt. Chapeau 15-50 mm, brillant, brun-gris plus ou moins sombre sur le frais, ochracé par temps sec, marge plus claire et striée par transparence. Lames blanches à crème grisâtre pâle, immuables. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur forte de farine. Basides 20-28 x 5-6  $\mu\text{m}$ , spores 4-5 x 2,5-3  $\mu\text{m}$  lisses, piléipellis en cutis plat.

La récolte présentée ici a été réalisée en novembre 2009 sur la commune du Bois-Plage en Ré. Le chapeau le plus grand atteignait 20 mm, l'odeur et la saveur étaient farineuses. La microscopie nous a montré des basides tétrasporiques 25-30 x 5-5,5  $\mu\text{m}$  et des spores 4,5-5 x 3(3,5)  $\mu\text{m}$ , nous n'avons pas vu de cheilocystides. Nous remercions M. Pierre-Arthur Moreau pour son aide apportée à la détermination de cette récolte et pour ses éclaircissements sur ce binôme controversé et parfois mal interprété.

Biblio : Rivista du Micologia, 2002 - DM HS n° 5 - Funga nordica.

*Fiche réalisée en mai 2016 par Patrice TANCHAUD*