



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Morchellaceae*

Morchella esculenta (L. : Fr.) Pers.

Synonymes : *M. rotunda*, variétés de *M. conica* ss. auct.

Noms français : Morille comestible, Morille blonde

Au printemps, sous arbres fruitiers ou sous frênes. Chapeau irrégulièrement globuleux ou allongé, ochracé à brunâtre ; alvéoles assez réguliers, fermés, et peu boursoufflés. Stipe blanchâtre. Absence de vallécule (espace entre le chapeau et le haut du stipe). Odeur faible. Spores 19-21 x 11-12 µm.


A comparer avec deux espèces à alvéoles irréguliers :

- *M. vulgaris* : souvent gris sale, présence d'une vallécule ;
- *M. dunensis* : en milieu dunaire.

Cette morille est occasionnelle, par exemple sous les pommiers ou autres fruitiers dans les vergers, durant les mois de mars et d'avril.

Biblio : littérature courante - Bull. SMF 126, fasc. 3 & 4, 2010 - Mycologia, 107(2), 2015, pp. 359-382.





Ces trois photographies présentent des récoltes réalisées sur plusieurs années, entre 2008 et 2013, toujours au mois de mars, sous un pêcher situé en bordure d'un chemin empierré et gravillonné, dans notre jardin à Soullignonne.