



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Morchellaceae*

## *Morchella elata* Fries

Synonymes : *M. costata*, *M. importuna* ss. auct. (binôme aujourd'hui reconnu et distingué pour le continent américain).

Parmi les écorces, dans les vergers, sur places à feu ou vieux journaux. Chapeau allongé, brun-noir à fauve olivâtre, avec des alvéoles souvent bien alignés (pouvant rappeler les mailles d'un pull-over) et le sommet des côtes généralement noircissant. Stipe blanchâtre crème. Spores 20-22 x 12-13 µm.

A ce jour, nous avons observé cette morille sous pommiers et poiriers, elle n'y est pas très fréquente. Page deux, une récolte réalisée sur place à feu.

Biblio : Bull. SMF 126, 2010 - Mycologia 104(5): 1172, 2012.

*Fiche réalisée en avril 2020 par Patrice TANCHAUD*





Ci-contre : récolte réalisée en avril 2008 sous pommiers, pourrait faire penser à *M. eximia*, taxon méditerranéen ; mais nous sommes probablement en présence d'une forme de *M. importuna*, comme nous le confirme M. Philippe Clowez, spécialiste du genre.



Ci-contre : récolte réalisée en avril 2008 dans un milieu empierré après arrachage de frênes, rappelant fortement *M. vaporaria* var. *tholiformis*. Ce taxon n'est plus retenu dans les études récentes, il semble s'agir d'une forme luxuriante de *M. importuna*, comme nous l'indique M. Philippe Clowez, que nous remercions vivement.