



Ordre : *Leotiales*

Famille : *Hyaloscyphaceae*

Hamatocanthoscypha laricionis (Velenovsky) Svrcek

Synonyme : *Hyaloscypha laricionis*

Sur cônes de pin ou de cèdre, parfois sur bois. Apothécies 0,1-0,6 mm, blanches. Marge garnie de poils, typiques du genre, courbés au sommet. Asques amyloïdes, spores 4-8 x 1-2 µm.

Avec l'écologie, et du fait que peu d'espèces existent dans ce genre, cet ascomycète, malgré sa petite taille, n'est pas très difficile à déterminer dès l'instant où les poils et les spores ont été contrôlés au microscope. Nous n'avions jamais particulièrement fait attention à sa présence dans notre secteur, mais des collègues le rencontrent régulièrement, et nous l'avons récolté personnellement à plusieurs reprises en mars 2014 lors de recherches systématiques sur écorces ou cônes de cèdres (Bédénac et Soyaux).

A noter en page 2, une récolte réalisée sur écorce d'*Eucalyptus* à Cellesfrouin (16), où les asques se sont avérés non amyloïdes ; reste à savoir s'il s'agit de la même espèce ou non (M. H.O. Baral nous ayant fait savoir qu'il avait en instance une récolte similaire, et non identifiée, sur cône de mélèze).

Biblio : Nordic macromycetes vol. 1 p. 191 - DVD H.O. Baral

Fiche réalisée en avril 2014 par Patrice TANCHAUD

