



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Morchellaceae*

Disciotis venosa (Pers. : Fr.) Arnault

Nom français : Pézize veinée

Espèce printanière dans les sous-bois frais. Apothécie 5-20 cm, brun clair à brun sombre avec l'âge, centre fortement veiné plissé. Odeur plus ou moins nette d'eau de Javel. Spores 20-25 x 12-14 µm pourvues de fines gouttelettes aux extrémités.

Quelques espèces des genres *Gyromitra* et *Peziza* peuvent ressembler, également printanières, mais en cas de doute les spores sont très nettement différentes :

- *Gyromitra perlata* : sur bois ou débris de bois de conifères, généralement d'épicéa ou de pin ;
- *Gyromitra parma* : au sol ou sur bois en forêts humides de feuillus ;
- *Peziza varia* : sur sol ou sur bois pourrissant.

Ce gros ascomycète semble assez rare sur nos lieux de prospection, nous l'observons entre les mois de mars et de mai, souvent dans les milieux humides, sur quelques stations à La Chapelle des Pots, Echillais et Graves (récoltes avec notre collègue Robert Lagarde en Charente) ; à noter également une récolte dans un verger sous poiriers, à Chaniers.

Biblio : littérature courante.

Fiche réalisée en mai 2019 par Patrice TANCHAUD





