



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Infundibulicybe mediterranea Vizzini, Contu et Musumeci

Synonyme : *Clitocybe gibba* var. *mediterranea*

En forêt, souvent sous chênes verts. Chapeau brun rougeâtre à ochracé roussâtre, marge ondulée. Lames blanches, décurrentes. Stipe concolore au chapeau. Odeur aromatique. KOH sans réaction ou décolorant la cuticule (à tester sur exsiccatum). Spores 4,5-7 x 3-5 μm , larmiformes. Dans notre région, à comparer surtout avec *I. gibba* (souvent plus pâle, notamment le stipe, cf. cette fiche avec tableau comparatif page 2), et *I. costata* (sans teintes rousses).

Les récoltes que nous présentons ont été réalisées en novembre 2009, sous chênes verts à Souligonne et à Fouras. A l'époque, nous pensions être en présence d'*I. costata*, mais en étudiant à nouveau ces deux récoltes, nous pensons nettement être en présence de l'espèce décrite ici, les dimensions sporales relevées (5,5-7 x 3,5-4 μm) nous confortant dans cette identification. Nous précisons que la réaction au KOH n'a pas été faite, test que nous ne manquerons pas de réaliser lors de prochaines récoltes.

Biblio : Mille et un champignons P. Roux - GEPR p. 572.

Fiche réalisée en août 2015 par Patrice TANCHAUD

