



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Pseudoomphalina pachyphylla (Fr.:Fr.) Knudsen

Synonymes : *Clitocybe incomis*, *Pseudolaccaria pachyphylla*

Nom français : Clitocybe absinthe

Sous conifères, parfois sous feuillus, aussi en milieu herbeux sur sol sableux. Chapeau 1-3 cm, hygrophane, beige brunâtre à crème grisâtre. Lames larges et épaisses, blanchâtre crème. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur farineuse, saveur typiquement farineuse et amère. Spores 8,5-11 x 5-7 μm faiblement amyloïdes. A comparer avec *P. kalchbrenneri* à chapeau givré, lames arquées un peu décurrentes et saveur seulement farineuse.

Espèce probablement peu fréquente dans notre région, mais pouvant aussi se confondre avec de nombreux champignons de tous genres aux teintes plus ou moins similaires (*Clitocybe*, etc.) ; sur le terrain, les lames, l'odeur et la saveur doivent mettre sur la piste. Nous l'avons observée mi-janvier 2017 dans deux sous-bois plantés en épicéas et douglas, à St Romain de Benet et St Sulpice d'Arnoult. Nous ne manquerons pas de passer à nouveau sur ces secteurs afin de tenter de dénicher des exemplaires plus photogéniques.

Biblio : Funga nordica - GEPR p. 530.