



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

## *Omphalina albominutella* E. Ludwig

Sur sol nu ou parmi les mousses. Petite espèce entièrement blanche. Chapeau jusqu'à 1 cm, légèrement duveteux. Lames blanches, fourchues. Stipe blanc et central, parfois bulbilleux à la base. Spores (4,5)5-6(7,5) x (2,5)3-3,5 µm. Se différencie d'espèces similaires par ses spores non amyloïdes, l'absence de cystides et de boucles.

Ces petits champignons nous ont longtemps intrigué, c'est dans l'ouvrage cité ci-dessous que nous avons l'impression d'avoir peut-être trouvé la solution. Nos différentes récoltes ont été réalisées sur terre nue, en milieu frais sous *Populus cf. nigra*, à St Yrieix (16) en mai 2007, à Leuzois à Soullignottes (17) en juin 2007 et à Graves (16) en août 2008.

Description : Chapeaux ne dépassant pas 1 cm, cuticule brillante duveteuse. Lames décurrentes, fourchues, blanches et le restant à maturité (nous faisant écarter le genre *Clitopilus*). Stipes 0,7-1,5 cm.

Microscopie : Basides tétrasporiques 18-25 x 7-8 µm. Spores hyalines (non côtelées et nous faisant là aussi écarter le genre *Clitopilus*) 5-7 x 3,5-4 µm ni amyloïdes ni dextrinoïdes. Pas de cystides observées. Cuticule constituée d'hyphes cylindriques incrustées. Chair non métachromatique. Boucles absentes.

Biblio : Ehrhard Ludwig, Pilzkompodium Band 1.